



SÃO JOÃO

**Serviços Farmacêuticos do  
Centro Hospitalar de São João**

**Diretor de Serviço:  
Dr. Paulo Horta Carinha**



Em caso de dúvida  
contacte:

Unidade de Farmácia de  
Ambulatório

Tlm: 964017278

**Midazolam 2,5mg/ml  
Suspensão bucal**



Atenção! O midazolam suspensão bucal destina-se **exclusivamente** a uso bucal. **Não colocar agulha na seringa.**

### O que é o midazolam suspensão bucal e para que é utilizado?

✓ É um medicamento que pertence a um grupo terapêutico chamado de benzodiazepinas e é utilizado para parar uma crise convulsiva prolongada.

### Quando deve ser administrado o midazolam suspensão bucal?

✓ Deve ser administrado sempre que a crise convulsiva se mantenha para além de 5 minutos ou conforme indicação médica.

### Como deve ser conservado o midazolam suspensão bucal?

✓ À temperatura ambiente, protegido da exposição solar direta.

✓ Deve ser guardado num local acessível, embora **fora do alcance das crianças.**

### Como administrar midazolam suspensão bucal?

✓ Antes de administrar, verifique que o midazolam suspensão bucal se encontra dentro do prazo de validade.

#### Passo 1



✓ Desenrosque a tampa de fecho da ponta da seringa.

#### Passo 2



✓ Com o indicador e o polegar aperte suavemente a bochecha do doente e puxe-a para trás. Introduza a ponta da seringa na parte posterior do espaço entre o interior da bochecha e a gengiva inferior.

✓ Prima lentamente o êmbolo da seringa até o êmbolo parar, **administrando todo o conteúdo da seringa.** Se indicado pelo seu médico, pode administrar cerca de metade da dose lentamente num lado da boca e depois, a restante, do outro lado da boca.

✓ Se a crise continuar mais de 5 minutos **após** a administração de midazolam, deve ser chamada a **Emergência Médica (112).** **Não administrar novamente midazolam na mesma crise.**

### Onde levantar o medicamento midazolam suspensão bucal?

✓ O medicamento ser-lhe-á fornecido na **Unidade de Farmácia do Ambulatório** dos Serviços Farmacêuticos do Hospital São João, situada na parte da frente do hospital (Alameda Prof. Hernâni Monteiro), em frente à entrada do metro (entre as 9-16 horas, de 2ª a 6ª feira).

### Quando levantar o medicamento midazolam suspensão bucal?

✓ Após o levantamento das primeiras seringas, terá que solicitar a preparação de mais unidades contactando telefonicamente a Unidade de Farmácia do Ambulatório através do nº **964017278**. Deverá identificar-se o doente pelo nome e nº de processo do CHSJ (que consta no cartão do hospital).

✓ O pedido de preparação deverá ser efetuado com uma antecedência mínima de **72 horas**, relativamente ao levantamento.

✓ O pedido de preparação deverá ser efetuado sempre que tenha em sua posse apenas **uma dose** de midazolam suspensão bucal.

### O que fazer com as seringas de midazolam suspensão bucal que foram administradas ou ultrapassaram o prazo de validade?

✓ **Todas** as seringas administradas ou que ultrapassaram o prazo de validade terão que ser entregues na Unidade de Farmácia do Ambulatório, aquando do levantamento seguinte.